Приложение № I

Рекомендуемые критерии отбора пациентов для проведения профилактики с использованием комбинированного моноклонального антитела длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб (Эвушелд) против инфекции, вызванной COVTD-19

Для принятия решения о проведении профилактики с использованием комбинированного моноклонального антитела длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб (Эвушелд) против инфекции, вызванной COVID-19, взрослый пациент должен соответствовать следующим критериям:

- в настоящее время доказано не инфицирован SARS-CoV-2 также, насколько известно, не контактировал с лицом, инфицированным SARS-CoV-2, и имеет умеренное или тяжелое снижение иммунитета вследствие патологического состояния или применения иммуносупрессивных лекарственных препаратов или терапии, или отсутствует адекватный иммунный ответ на вакцинацию против COV1D-19;
- вакцинация имеющейся вакциной от COVID-19 в соответствии с одобренным или утвержденным графиком не рекомендована вследствие ранее перенесенной тяжелой нежелательной реакции (например, тяжелая аллергическая реакция) на вакшшу(ы) против COVID-19 и/или компонент(ы) вакцины против COVID-19.

Приоритетные нозологические группы, которым показано пассивной иммунизации против инфекции, вызванной COVID-19:

-пациенты с первичным иммунодефицитом;

-пациенты с вторичным иммунодефицитом, обусловленным иммуносупрессией (хронический лимфолейкоз, множественная миелома);

- пациенты, имеющие онкогематологическое заболевание и получающие в настоящий момент, или получившие в течение последних 12 месяцев терапию моноклональными антителами анти-CO20 или иммунохимиотерапию;
- на фоне трансплантации костного мозга или органов;
- на фоне применения лекарственных препаратов, ослабляющих иммунитет (пациенты ревматологического профиля, получающие цитостатики, ГИБП и др.);
- ожирение (ИМТ > 35);
- сердечно-сосудистое заболевание, включая артериальную гипертензию;
- хроническое заболевание легких, включая бронхиальную астму, ХОБЛ;
- сахарный диабет 1 или 2 типа;
- хроническое заболевание почек, включая заболевания, требующие диализа (4 стадия, СКФ < 30 мл/мин/1.73 $м^2$).